



Literatura técnica

Desonida

Uso: Externo

CAS: 638-94-8

Sumário

Introdução	pág. 4
Mecanismo de ação	pág. 4
Ficha técnica	pág. 5
Referência bibliográficas	pág. 7

Indicação: A desonida é indicada para o tratamento sintomático das manifestações inflamatórias e pruriginosas de dermatoses responsivas aos corticosteroides. Entre as condições tratadas incluem-se dermatite atópica, dermatite alérgica, eczema, psoríase e outras doenças inflamatórias da pele nas quais há resposta ao uso de corticosteroides tópicos. Sua ação contribui para o controle da inflamação cutânea e do prurido, proporcionando alívio dos sintomas associados a essas dermatoses.

Posologia e modo de usar: A desonida é administrada por via tópica, sendo aplicada diretamente sobre a área afetada da pele na concentração de 0,05 %. Para uso capilar a concentração pode chegar a 0,1 %. De modo geral, recomenda-se a aplicação do medicamento de uma a três vezes ao dia para adultos, ou conforme orientação médica, espalhando uma camada fina sobre a região acometida até completa absorção. Para crianças acima de 3 meses de idade, a recomendação é aplicar uma vez ao dia. A frequência e duração do tratamento podem variar conforme a gravidade da condição dermatológica e a resposta clínica do paciente.

Contraindicações: O uso da desonida é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida à substância ou a qualquer componente da formulação. A presença de reação alérgica prévia aos corticosteroides tópicos pode representar risco de agravamento de reações cutâneas ou outras manifestações adversas associadas ao tratamento. O uso da desonida em lesões em tuberculosas, sífilíticas e virais (como herpes, vacínia ou varicela) é contraindicada. Não deve ser utilizado nos olhos ou nas áreas próximas a eles. A desonida também é contraindicada para crianças menores de 3 meses de idade.

Advertências: O uso da desonida deve ser realizado com cautela em populações especiais. Durante a gravidez, o medicamento deve ser utilizado apenas quando claramente necessário e após avaliação dos benefícios e riscos do tratamento. Em mulheres em período de lactação, recomenda-se cautela no uso tomando cuidado para não realizar a aplicação nos seios pouco antes de amamentar. Em pacientes pediátricos deve haver acompanhamento adequado para evitar efeitos sistêmicos decorrentes da absorção cutânea de corticosteroides. Em pacientes diabéticos ou com tuberculose deve-se avaliar cuidadosamente a relação risco-benefício em caso de tratamento prolongado.

Interações medicamentosas: Interações medicamentosas envolvendo a desonida podem ocorrer, especialmente quando utilizada concomitantemente com outros fármacos que apresentam efeitos metabólicos semelhantes ou que influenciam a ação de corticosteroides. Alguns medicamentos podem aumentar a concentração sérica de desonida ou potencializar determinados efeitos adversos. Por exemplo, a associação com abametapir pode aumentar a concentração do fármaco, enquanto o uso concomitante com agentes como acarbose ou acetohexamida pode aumentar o risco ou a gravidade de hiperglicemia.

O uso prolongado ou em áreas extensas da pele pode aumentar o risco de absorção sistêmica de corticosteroides tópicos, especialmente em crianças. Dessa forma, recomenda-se cautela quanto à duração do tratamento e à área de aplicação. Em situações como gravidez ou lactação, a administração deve ocorrer apenas quando os benefícios potenciais superarem os riscos.

Reações Adversas: As reações adversas mais frequentemente relatadas com o uso tópico de desonida incluem sensação de ardor ou queimação no local de aplicação. Em menor frequência podem ocorrer dermatite de contato, descamação da pele, prurido, eritema transitório intenso e ressecamento ou descamação cutânea. Esses eventos geralmente são locais e associados ao uso tópico do medicamento.

Introdução

A desonida é um corticosteroide sintético não fluorado utilizado principalmente em preparações tópicas dermatológicas para o tratamento de condições inflamatórias da pele. Pertence à classe dos corticosteroides tópicos com propriedades anti-inflamatórias, antipruriginosas e vasoconstritoras. Esses agentes são amplamente utilizados no manejo de dermatoses inflamatórias sensíveis a corticosteroides, atuando na redução dos sinais e sintomas associados à inflamação cutânea, como eritema, edema e prurido. A desonida é considerada um corticosteroide tópico de potência moderada e apresenta perfil de segurança semelhante ao da hidrocortisona, embora possua eficácia comparável à de corticosteroides mais potentes em determinadas condições dermatológicas.

Mecanismo de Ação

A desonida atua como agonista do receptor de glicocorticoide. Após aplicação tópica, o fármaco liga-se aos receptores citosólicos de glicocorticoides, formando um complexo que migra para o núcleo celular e interage com elementos regulatórios do DNA. Essa interação modula a expressão de diversos genes relacionados à resposta inflamatória. Um dos efeitos importantes desse mecanismo envolve a indução de proteínas inibitórias da fosfolipase A2, conhecidas como lipocortinas, que reduzem a liberação de ácido araquidônico a partir dos fosfolipídios da membrana celular. Como consequência, ocorre diminuição da síntese de mediadores inflamatórios, como prostaglandinas e leucotrienos, resultando em redução da inflamação, do prurido e da resposta vasodilatadora local.

Ficha técnica

Uso recomendado

EXTERNO

Características do ativo

Aspecto: Pó ou cristal

Cor: Branco

Solubilidade: Praticamente insolúvel em água.

Recomendações farmacotécnicas

Advertências e restrições de uso

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxágue com água abundante. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Recomendações de armazenamento e transporte:

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado. Armazenar em temperatura ambiente e proteger contra incidência solar direta.

Lote e validade

Vide embalagem.

Referências bibliográficas

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Desonida – bula de medicamento. Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q?nomeProduto=desonida>. Acesso em: 5 mar. 2026.
- DRUGBANK ONLINE. Desonide. Disponível em: <https://go.drugbank.com/drugs/DB01260>. Acesso em: 5 mar. 2026.
- DRUGS.COM. Desonide. Disponível em: <https://www.drugs.com/ingredient/desonide.html>. Acesso em: 5 mar. 2026.

Literatura técnica

Desonida

**SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS**

@irialmag

Irial  **Mag**

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br