



Literatura técnica

Triancinolona Base Micro

Uso: Interno

CAS: 124-94-7

Sumário

Introdução	pág. 5
Mecanismo de ação	pág. 5
Ficha técnica	pág. 6
Referência bibliográficas	pág. 8

Indicação: A triancinolona base é indicada para o tratamento de diversas condições inflamatórias e alérgicas que respondem a corticosteroides, incluindo, doenças reumáticas, distúrbios alérgicos como rinite e asma, além de condições autoimunes e inflamatórias sistêmicas.

Posologia e modo de usar: A posologia da Triancinolona Base para uso oral varia de 4 a 48mg ao dia para adultos, podendo ser administrada em dose única ou múltiplas. O uso pediátrico da triancinolona envolve doses orais que vão de 0,117mg/kg a 1,7mg/kg ao dia.

Contraindicações: A triancinolona é contraindicada em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao fármaco ou a qualquer componente da formulação, bem como em infecções sistêmicas não tratadas, especialmente infecções fúngicas.

Advertências: O uso sistêmico de triancinolona pode causar supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, especialmente em tratamentos prolongados ou em doses elevadas. Deve-se ter cautela em pacientes com infecções, pois os corticosteroides podem mascarar sinais clínicos e agravar quadros infecciosos. Há risco de desenvolvimento de síndrome de Cushing, hiperglicemia, osteoporose e alterações psiquiátricas.

O uso deve ser cauteloso em pacientes com doenças metabólicas, cardiovasculares, gastrintestinais ou infecciosas. Em crianças, pode haver impacto no crescimento. Em tratamentos prolongados, é essencial monitoramento clínico e laboratorial. A interrupção do tratamento deve ser gradual para evitar insuficiência adrenal aguda.

Interações medicamentosas: A triancinolona pode interagir com fármacos que induzem ou inibem enzimas hepáticas, alterando seu metabolismo e concentração plasmática. Pode haver interação com anti-inflamatórios não esteroidais, aumentando o risco de efeitos gastrintestinais, e com medicamentos que afetam o equilíbrio eletrolítico. Além disso, pode reduzir a resposta a vacinas e interferir em testes laboratoriais.

Reações Adversas: As reações adversas sistêmicas incluem retenção de líquidos, hipertensão, hiperglicemia, aumento do apetite, ganho de peso, alterações de humor, insônia e supressão adrenal. O uso prolongado pode levar a osteoporose, fraqueza muscular, maior suscetibilidade a infecções e alterações endócrinas, como síndrome de Cushing.

Introdução

A triancinolona é um corticosteroide sintético pertencente à classe dos glicocorticoides, amplamente utilizado por suas propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras em diferentes tecidos e sistemas do organismo. Apresenta atividade predominantemente glicocorticoide, com mínima atividade mineralocorticoide, sendo empregada em diversas formas farmacêuticas para uso tópico, sistêmico e local, a depender da característica do ativo (ácido ou base). A forma base micro caracteriza-se por apresentar partículas micronizadas, o que resulta em aumento da área de superfície do fármaco, favorecendo sua dissolução e biodisponibilidade quando administrada por via oral. Essa característica tecnológica contribui para maior uniformidade de dose e potencial melhora na absorção sistêmica.

Mecanismo de Ação

A triancinolona exerce seus efeitos ao se ligar aos receptores glicocorticoides intracelulares, modulando a transcrição de genes relacionados à inflamação. Inibe a fosfolipase A2, reduzindo a produção de ácido araquidônico e, conseqüentemente, de prostaglandinas e leucotrienos. Também diminui a migração de células inflamatórias e a permeabilidade capilar, resultando em potente efeito anti-inflamatório e imunossupressor.

Recomendações farmacotécnicas

Advertências e restrições de uso

USO INTERNO. Produto destinado ao consumo oral. Não exceder a recomendação diária de consumo. Manter fora do alcance de crianças. Gestantes, lactantes e crianças somente devem consumir este produto sob orientação de profissional de saúde. Em caso de hipersensibilidade a algum dos componentes, suspender o uso.

Recomendações de armazenamento e transporte:

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado. Armazenar em temperatura ambiente e proteger contra incidência solar direta.

Lote e validade

Vide embalagem.

Referências bibliográficas

- DRUGS.COM. Triamcinolone: uses, dosage, side effects, warnings. Disponível em: <https://www.drugs.com/triamcinolone.html>. Acesso em: 24 mar. 2026.
- DRUGBANK ONLINE. Triamcinolone. Disponível em: <https://go.drugbank.com/drugs/DB00620>. Acesso em: 23 mar. 2026.

Literatura técnica

Triancinolona Base Micro

**SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS**

@irialmag

Irial  **Mag**

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br